

H. Viiding
Devoni p-augud

(9)

CKB. 263.

KAUSTIK

Barryma

Rõngust ca
5 km loodes
kolhoosi korteri
juures

Laanemetsa

HERBERT VIIDING; PÄEVIK 9

H. VIIDING; PÄEVIK 9 SISUKORD

1. VALGUTA 263 PUURAIK: 1-59
2. H. Viidingu proovd valguta 61
263 puuraugust
3. Laanemetsa? puuraugust 63-65

(1,90-1,92)

(1,30-1,40)

0,00 - 2,80
2,45

2,80 - 5,80
2,44

1.05r. 2330 (H.V.)

(2,80-2,85) (0,00-0,05)

2.05r. 2332 (E.M.)

(2,70-4,72)

2.05r. 2334 (H.V.)

(4,10-4,20)

-1-
0,32 korba, с расщепленными
попробоим

1,20 (+0,20) песок пористый, от
мелко- до среднезернистого,
карбонатно-серый, содержащий од-
нородные среднесзернистые карбо-
наты, вкрапления, а также карбо-
наты кристаллические и кар-
бонатные пороги, размером до
2-3 см. Количество песка в
песчаном в нижней части

0,93 (+0,15) суглинок, серо-
голубой, с гравием и карбо-
наты (пороги). Количество
песка довольно большое, пре-
обладают карбонатные пороги
с опилками. 25:1 к круп-
нозернистым порогам, карбо-
наты

2,04 (+0,30) суглинок, с гравием
карбонатно-бурым пылевым, в верхней
части пересечен в суглинок
(0,20), вкрапления вторич-
ные, карбонатные и кристаллические
пороги, соотношение и
карбонатные и кристаллические
пороги 20:5.

Размер карбонатных поро-
гов до 10 см в поперечнике, расщеп-
ленные размеры 1-5 см,
всперех и один гранит
среднезернистый на самом
нижнем уровне. По срав-
нению с морской водой вы-
шеуказанные размеры, карбонатные

040(+0,26) суглинок, глинистый
глинисто-песчаный бурого цвета
средне суглинистый

(2,24-2,34) 305. 2333 (H.V.)
(5,34-5,44)

5,80 - 8,80
3,00

суглинок, с мелкими гравиями
кремнистыми и карбонат-
ными породами, светло-серый, со-
держит обломки кремни-
стых пород различного до
10 см (красные слои, сфиз-
критовый и рваный
гобеландовый флюидит и
карбонатные породы
содержащие карбонатные и кри-
сталлические породы 16:9

(0,00-0,50)

4. 05. 2334 (H.V.)
(5,80-6,30)

(1,55-1,60)

5. 05. 2335 (H.V.)
(7,35-7,40)

8,80 - 10,80
1,86

1,27 суглинок, с мелкими
гравиями крист. и карб. пород,
светло-серый, пачка встре-
чается сравнительно редко,
только в нижней части на-
блюдается пачка карбонатная
размером 8 см.
0,48 глина, глинисто-серо-
вато-бурого цвета, мас-
листая. Присутствует в виде
мелкозернистый суглинок по-
степенный. В глинах встре-
чается обломки (10 см в по-
перечнике) доломита, желтого

сероцветный. На глубине 2,25-
температурная прокладка (или)
покрашено окрашенного цвета,
мелкозернистый, обожженный
серебрян

(1,80-1,90)

7.05р. 2337 (H.V.)
(12,80-12,90)

(2,40-2,50)

8.05р. 2338 (A.T.)
(13,40-13,50)

13,50 - 17,30
2,10

0,65 (+0,70) песок, мелкозерни-
стый, сероцветный, в верхний
и средний пласт красной
мудры, в средний пласт
песчановидный, пористый
0,27 асбест, мелко-
зернистый, от темно-го
крупнозернистого, переслаиваю-
ся тонкие слои мелкозер-
нистого, сероцветного и зеленовато-
серого цвета, горизонталь-
но расположенный

(1,60-1,70)

9
05р. 2339 (H.V.)
(15,80-15,90)

17,30 - 18,50
1,16

1,00 (+1,00) песок, мелкозер-
нистый, в верхний пласт
мудры, в средний пласт крас-
новатомудры
0,18 асбест, мелкозерни-
стый, переслаивающийся про-
слойки мелкозернистого
крупнозернистого и зе-
леновато-серого асбеста,
крупнозернистого

0,45 (+0,45) асбест, крупно-
зернистый, серовато-бурый, и-
ррегулярная структура нес-
колько мелкозернистый пре-
обладающего цвета.

(0,55-0,65)

(0,75-0,80)

(0,45-0,53)

10
оср. 2340 (H.V.)
(17,85-17,95)

11
оср. 2341 (K.K.)
(18,05-18,10)

18,50-19,10
0,53

12
оср. 2342 (KK.)
(19,00-19,10)

19,10-21,50
1,45

0,10 алевромин, буровато-красной, мелкозернистой, незначительной, переслаивается тонкими прослойками алевроминно-крупнозернистого, жел-серого цвета.

0,16(+0,04) песчаная, флюидно-покрытого цвета, мелкозернистой, слабоуплотненной.

0,45- глина, красноватого цвета, алевринистая, особенно в нижней части. 0,02 самой нижней части переслаивается алевромин, крупнозернистой, жел-сер., незначительной.

~~0,53~~ 0,35(+0,07) алевромин, в нижней части красновато-бурого, в верхней части 0,15 жел-зеленовато-серый. 0,18 алевромин, неуплотненный, буровато-серого, зеленовато-серого цвета, доломитовый, кристаллический, слабо сцепленный, с тонкими горизонтальными, крупнозернистой.

0,15 алевромин, аналогичный, но менее сцепленный. 0,80(+0,30) алевромин, красновато-бурый, глинистый, переслаивается алевромин, более крупнозернистой, глинистой, жел-серого цвета. Боле известная прослойка (0,13) более светлая на устье 0,35 сверху +0,50

(0,95-1,05)

(0,00-0,05)

(1,95-2,00)

13

Обр. 2343 KK
(20,35-20,45)

0,10(+0,05) неоглинка, серогли-
нистый, сизоватый, зерни-
сто-серого цвета, в основном
мелкозернистый, из серого
0,40(+0,60) алевролит, крупно-
зернистый, зернисто-серый,
с буроватым оттенком, серогли-
нистый, в основном мелкозернистый,
в неоглине мелкозернистый, с редки-
ми суглинистыми прожилками

21,50 - 24,50
2,00

14

Обр. 2344 (H.V.)
(21,50-21,55)

1,00(+0,70) неоглинка, мел-
козернистый до среднезерни-
стый, серовато-бурого до бу-
ропестного цвета, в основном
мелкозернистый, слабо суглинисто-
ватый, на устье (высота 0,20) в пере-
дней части прослойка неоглинка
мощностью 0,06, очень креп-
ко суглинисто-ватый, розо-
вато-бурого цвета
0,50 алевролит, в пере-
дней части зернисто-серый, крупно-
зернистый, в основной части
буровато-серый, среднезерни-
стый, не сиповатый
0,25(+0,15) неоглинка мелкоз-
ернистая, серовато-серый,
0,25(+0,15) неоглинка мелко-
зернистый, красновато-серый,
сизоватый, в основном

15

Обр. 2345 (A.T.)
(24,40-24,50)

(0,40-0,50)

(1,50-1,53)

(2,05-2,10)

-13-
24,50-29,50
2,10

16
обр. 12346 (H.V.)
(25,00-25,10)

16a
обр. 12347 (E.M.)
(29,00-29,03)

17
обр. 12348 H.V.
(29,55-29,60)

29,60-32,20
1,90

0,08 (+0,10) некрамми, анемоморфный
0,25 амброзием, некрамми-
базовая супрацеллюлярная и супро-
базовая прослойка
+0,50 0,30 (+0,10) некрамми, мезозерни-
стый, красновато-бурый, сито-
очечный коллоидальный сре-
дотканый
0,20 некрамми, мезозернистый,
зеленовато-серый ситовидный
с мучной массой, переходящий
почти полностью в амброзию
0,25 амброзия, мезо-го-
фризерный, буровато-крас-
ный с зеленовато-серыми
пятнами, в мучной массе
приморозочный, горизонталь-
но-волнистый
1,02 (+2,40) песок и некрамми
средотканый ровный, мел-
ко-гофризерный, ситовид-
ный, местами пересла-
бавленная прослойка ам-
брозии, найден на уровне 1,50
сверху оформленным рудой

1,00 (+0,50) амброзия, зел.-сер.,
приморозочный, горизонталь-
ный, ситовидный, переходящий
в мучную массу с амбрози-
ею буровато-красного цвета, мезо-
зернистый, в мучной мас-
се мучной, амброзием, ам-
брозием, прослойка

(0,40 - 0,45)

(0,45 - 0,50)

(0,88 - 0,94)

32, 20 - 34, 80

1, 84

18

оср. 2349 A.T.

18a (32,60-32,65) но 6

оср. 2350 E.M.

(32,65-32,70)

19

оср. 2351 K.K.

(33,34-33,40)

0,88 - 94

мелкозернистый до 0,05 м.
0,18 перья, длинный, кис-
лый, красновато-бурый, жел-сер-
ый, нежный

0,22 (0,20) амброзия, кислый,
жел-оранж и ~~красновато~~ серо-оран-
жевого цвета, крупнозерни-
стый

0,50 перья, сильно амбро-
зиный, буроватый, с мелки-
ми желто-серыми пятнами,
мелкими низки жел-оранж
амброзии, крупнозернистого,
размером 5 см в поперечнике

0,40 перья, анастомный,
длинные 2 см амброзия,
крупнозернистый, жел-серый,
который переносит носитель-
но 6 численности негра-
E.M.

0,40 (+0,26) неграми, мелкозерни-
стый, светло-серый, в чис-
ленности содержатся неграми
низки более красной цве-
та, мелкогозернистого, неграми, не-
маленького размера, в верхней
части буроватого цвета, ор-
ганов

0,70 амброзия, кисло-
зернистый, в основном желто-
белосерый, беловато-оранжевый,
оранжево-серый и ~~фиолето-~~
~~вокрасный~~ нежный,
в нижней части мелкими
предлагает буровато-крас-
ный цвет.

В и центре 0,50 - 0,57 не-
грами мелкозернистый, светле-

мелкий зер. серый, амброзиевый
в верхней части сильно из-
мельчавший
0,34(+0,50) нежная, красно-
коричневая, с
амброзиевой, поперечной,
полосчатой

(1,50-1,60)

20
обр. 2352 H.V.
(34,46-34,56)

34,80 - 37,00
2,20

0,50 амброзия, передняя
прокладка буроватого, мелко-
зернистого, темнозелено-серого, мелко-
зернистого, мелкозернистого,
серого, фиолетово-бурого
амброзия
0,20 перья, с сильно амб-
розиевой, буроватой
с жел.-серым и фиолетово-
бурым пятнами амброзия
0,30 нежная, очень мелко-
зернистая, мелкозернистая с
амброзией, бурой, в нижней
части 6-7 см. темнозелено-
серого цвета
0,25 перья, мелкозернистая,
краснобурой, с поперечной-
ли с амброзией
0,80 амброзия, местами
перистая, неоплодотворенная,
буроватой и жел.-серой, в
нижней части (0,40), серо-
ореховатой, очень нежная, от
мелко до крупно зернистой.
В интервале 0,20-0,28, амб-
розия жел.-серой переложена в
нежную, мелкозернистую,
темнозелено-серую

(2,10 - 2,20)

(0,40 - 0,50)

(0,55 - 1,00)

(1,60 - 1,70)

(1,60 - 1,65)

- 19 -

21

оср. 2353 (H.V.)

(36,90 - 37,00)

37,00 - 37,60

0,60

37,60 - 41,40

1,70

22

оср. 2354 (H.V.)

(38,70 - 38,80)

оср. 2355 (E.M.)

(39,25 - 39,30)

23 оср. 2356 (H.V.)

(41,30 - 41,40)

41,40 - 44,80

3,30

24

оср. 2357 A.T.

(43,00 - 43,05)

0,15 неоглини мелкозернистый, слабожелезистый серый, слабоокисленный провалы

0,60 неоглини мелкозернистый, корич.-серый с буровато-красным, с редкими поверхностными трещинами, слабо до среднеокисленный провалы

0,10 арилозит, неоглини, буровато-красный и жел.-серый извести, 0,80(+0,70) неоглини, коричневато-красный, мелкозернистый

неокисленный, буровато-красный, мелкозернистый, слабо до среднеокисленный провалы

0,05 мергель, неокисленный, арилозит, буровато-красный

0,75(+1,40) песок и неоглини, слабоокисленный провалы, мелкозернистый, слабобурый, в верхней части желтовато-серый прослойки, содержащие незначительное количество зерен кварца, опесчаненные субпараллельно. В этой прослойке встречаются опресненные провалы

песок и неоглини, слабо до среднеокисленные провалы, мелкозернистый, слабобурый до красноватобурый, коричневато-красный и неокисленный, местами с редкими поверхностными трещинами и мелкими до 0,5 см прослойками глины

(2,28 - 2,34)

(2,10 - 2,15)

(3,00 - 3,10)

28. 05. 2364 H.V.
(50,28 - 50,34)

50,50 - 53,60
3,10

29. 05. 2365 A.T.
(52,60 - 52,65)

30. 05. 2366 H.V.
(53,50 - 53,60)

53,60 - 56,60
1,70

0,04 мерель, минеральный, супро-
вимоносительный.
1,30 мерель, слабоокисленный,
розоватый до среднекрасного,
беловатый, беловатый, мелко-
зернистый, сизоватый, блуж-
ночекато синеваватый, бел-
ловый, так что поперек
0,50 дощато минерал до
интенсивно беловатого зеле-
новатого оттенком, ко-
солоносный
0,16 мерель, пропорцион-
ный и пропорциональный,
мелкий в верхней части
сильно минеральный, поперек
поперек тонкий сизый зеле-
новато-серо минеральный
мерель (1 см)

0,15 мерель, анемонный.
2,95 мерель, беловатый
до розоватый, мелкозернистый,
сизоватый, косолоносный, сиз-
оватый, беловатый.
Верхушка 0,20 беловато-серый, с
зеленоватым оттенком.

0,65 (+0,10) анемонный
0,17 мерель, в верхней части
минеральный, в нижней части
анемонный.
0,48 (+0,10) анемонный, мелкий
преимущественно серый и зеле-
серый, крупнозернистый, и
красноватый, мелкозернистый

$$(1,55 - 1,63)$$
$$(3,03 - 3,08)$$
$$(2,83 - 2,87)$$

алюбоминная, иногда перо-
счатая перистая
0,40 (+1,00) крупн. крупн. Буре-
мин, перистая мелкозерни-
стая, жел.-серый до бурого цвета,
перистая, истонченная, слабо-
до слабо зернистая, содержит до-
полнительные крупные зернистые
повышенного содержания и сильной
плотности
0,65 (+0,20) аллювиальная, жел.-
серая, крупнозернистая, тон-
козернистая, перистая, с
аллювиальной буровато-красной
краской и перистая, зерни-
стая, такая же красная.

56.60 - 60.30

3, 13

31

05. 2367 H.V.

$$(58,15 - 58,23)$$

32a

05h. 2369 (E.M)

 $(60, 20-60, 25)$

32

05. 23.68

(60,00 - 60,05)


К.К. с зеленоватыми пятнами,
мелкозернистого, слоистого.
0,15 мери, светло-зелено-
ватой, с мелкими пятны-
ми. Боли светлого сере-
бри

(0,90-0,95)

(1,00-1,10)

(1,00-1,10)

(1,30-1,35)



(в верхний пласт
микрофауна)

60,30-61,60
0,95

33

Одр. 2370 H.V.
(61,55-61,60)

²⁷
алевролит, мелко-бурый ил-
ма, мелкозернистый, мелкозер-
нистый, в верхней 0,20 бу-
рожелтобурый, крупнозер-
нистый

61,60-63,20
1,53

34.

Одр. 2371 A.T.
(62,60-62,70)

1,00 алевролит, в верхней и
нижней пласт светло-зел.
серый, крупнозернистый, в
средней пласт мелкозернистый,
краснобурый ил-ма.

0,10 (+0,07) неогранный, мелкозер-
нистый, светлобурый с тем-
нобурой окраской

34

Одр. 2371 H.V.
(62,60-62,70)

0,43 алевролит, крупнозер-
нистый, светлосерый в
верхней пласт буровато-серый,
слабозернистый окраской,
в нижней пласт очень круп-
ный

35

Одр. 2372 K.K.

(62,90-62,95)

63,20-66,50
3,15

0,07 неогранный, кварцитагообразный
красножелтоватый, слабозернистый,
светлобурый

36 Одр. 2373 H.V.
(63,20-63,27)

(0,00-0,07)
0,68 мерль, серооливчатый ме-
талит мелкозернистый, в верхней 0,08
зеленовато-серый

1,25 алевролитовый, от мелко- до
крупнозернистого, преобладает крас-
нобурый ил-ма, местами зел-се-
рый, особенно в верхней пласт
на уровне 0,60-0,75 мерль, ор

(0,80-0,85)

(2,35-2,45)

(2,42-3,60)

-29-

36a

Одр. 2374 E.M.
(65,00-65,05)

37a

Одр. 2375 H.V.
(65,70-65,80)
2,35-2,45

66,50-69,50

2,42 керн

0,58 мелан

(0,80-0,70)

38

Одр. 2377 H.V.
(68,92-69,50)

серо-оромеомокрасноватомудровый
В верхней части белесоватом
мелане Lingule
0,95 (+0,15) некрамми, красновато-
мудровый, мелкозернистый, несо-
соединенный, ароматический небер-
ностами

0,20 амброуми, мелко-го кру-
позернистый, бурыхватый, с
мелким зеленовато-серым мел-
ном.

2,42 амброуми, с оловом бу-
рокраевый, с зелено-серым мел-
ном, он мелко-го крупнозер-
нистый, в минерале 0,58-1,15
распространен зелено-серый го-
лоскопный слан. Куски этого
красноватомудровый го оромеомо-
мудровый слан. На уровне 0,80-0,90
температура зелено-сером амбро-
уми оромеомом под.

Одр. 37a. 2376 E.M.
(67,30-67,40)

На уровне 0,95-1,00 амбро-
уми зел-серый белесоват
мелане оловом зеленой тем-
ной тем напавшим комно-
мерам. На уровне 1,10-1,15
и 1,45-1,55, 1,68-1,72, 1,78-1,83
некрамми, мелкозернистый, мине-
рный, оромеомокрасный. Окру-
жающий некрамми амброуми
очень крупнозернистый, несо-
соединенный, белесоватый в не-
крамми белесовато, мелкозернисто.
0,58 песок, белоскопный, с зелено-
ватом оловом, мелкозерни-
стый, минеральный

(1,10-1,13)

0,35; 0,30

(1,75-1,80)

(2,40-2,50)

69,50 - 73,00
2,50

оср. 39 2379

(70,60-70,63)

38a

оср. 2378

(69,85-69,90)

40. 2380.

оср. 2380

(71,25-71,30)

H.V.

41

оср. 2381

(72,90-73,00)

A.T.

73,00-76,10
2,85

-31-
1,30 мерзлота, аридоинтенсивной, сук-
ро красного цвета, в мерзлоте,
наименее зеленовато-серого цвета
(0,20) и с прослойками чер-
носерого аридоинтенсивного и сме-
танной мерзлоты. В среднем 1,00
однообразной, температурой однородной
фрагментации под на упрочения 0,35 и
0,70

КК 1,20 (+1,00) неокрашен, среднеинтен-
сивированный, и неокрашен, мелкозер-
нистый, мерзлотный, розовато-го крас-
ноты, в мерзлоте 0,15 черноты, с прослой-
ками розовато-го красноты. На упрочении
0,55-0,90 неокрашен, очень тонким
среднеинтенсивным прослойками, тон-
коокрашенным. В самой мерзлоте
наименее неокрашен, мелкозерни-
стой.

0,15 неокрашен, среднеинтенсивно-
красный, мелкозернистый, черноты,
с зеленоватыми прослойками
в мерзлоте, наименее мерзлотный в ро-
зоватом неокрашен, в котором
небольшое количество черноты и не-
большое количество черноты.

0,15 мерзлота, сукро-
красная, с зеленоватыми прослойками,
неокрашен, с зеленоватыми прослойками.

0,60 мерный, минеральный, дупро-
важносерый, с зеленоважносерым
аурикулярным прослойками
(очень тонкие) и мажками,
в нижней части аурикуляр-
ный, сложенный черноватым
м.

0,60(+0,15) мерный, мелкозер-
нистый, мажками очень тон-
козернистый, орловитово-бурый,
песчаный, сложенный ко-
бальдоватым в нижней
части (0,15) светло-серый, с
зеленоватым окрасом, средне
зернистый.

44 2384 (78,32-78,42)) H.V.
(1,85-1,95)

0,30 мерный, минеральный,
бурый, с мелкозернистым сложе-
нием,

0,43 аурикулярный, мажковато-
серый, зел.-серый, он мелко-
зернисто-зернистый, в верхней
части (0,05) прослойка мел-
козернистого песка, светло-се-
ро, сложенного.

79,20 - 82,50
2,95

0,10(+0,05) мерный, мелкозерни-
стый, светло-серый, сложенный ко-
сачинским, с мажками серид-
ки (1-2 см)

0,05 мерный, минеральный, светло-се-
рый

0,85 мерный, минеральный, дупро-
важносерый, с мелкозернистым сло-
жением орловитовым.

45 2385 (79,88-80,00) (KK)
(0,63-0,75)

0,15 амброум, зрелованно сирій,
срєне го крупнозернистий, в ній
ній расин послихено перекоси
в неоране, виправоме опра-
мений про

45a

08р. [2386] (80,40-80,45) EM.
(1,15-1,20)

0,20 (+0,10) неоране, фаносирій,
мелкозернистий, монотонний,
с косой срединностью, сирій,
1-2 см, сирій, с опра-
мением про

1,15 амброум, он срєне-
го крупнозернистого, зреловано-
красний, мелкозернистий, сир-
ючий, ~~зреловано-красний~~
василь послихено в ній
расин и перекоси в ~~амбро-
ум~~ неоране, оран, мелкозер-
нистий.

за губас 2,10-2,15 амбро-
ум оран крупнозернистий-
красний, мелкозернистий

0,45 (+0,20) неоране, мелкозерни-
стий, розовато-бурій, сирю-
чий, сирючий, послихено
м, срєне го крупнозернистий
василь, мелким розовато-бурій

46

08р. [2387] (82,15-82,25) (H.V.)
(0,30 см) (2,65-2,75)

82,50-85,70
2,92

0,08 амброум, мелкозерни-
стий, розовато-бурій, рози-
зовано-красний

0,50 (+0,15) неоране, мелкозер-
нистий, розовато-бурій, мелко-
зернистий, сирючий,

47

08р. [2388] (0,20-0,25)

0,10 амброум, средне-го круп-
нозернистый, монотонно-мелкий,
буро-красный, с тонким мелким
песчаным

0,15^(+0,05) амброум, мелкозернистый,
го-отель мелкозернистый, се-
ровато-бурый до красновато-бу-
рого, с тонким переходящим

0,15 амброум, от средне-го
крупнозернистый, буровато-крас-
ный, монотонно-мелкий.

0,03 мерил, мелкозернистый, орто-
кварцевый

0,05 амброум, крупнозерни-
стый, монотонно-мелкий, бурово-
серый

0,06 мерил, мелкозернистый, мон-
отонно-мелкий, бур- и флюидно-
серый

1,50 (0,08) амброум, верх-
нее 0,40 флюидно-бурый, мел-
козернистый, кристал-
лы, среднее 0,40 крупнозернистое,
красно-бурое, основное мел-
кое, мелко-го среднезерни-
стое, монотонно-мелкое, буровато-
красное, зеленовато-серо-
вый прослойками, в самой
мелкой 0,30 преобладают
зеленовато-серый цвет.

0,10 мерил, мелкозернистый, зе-
леновато-серый,

0,20 голубой, крупнокри-
сталлический, светло-серый,
кристал- мерил, с про-
лой или мерил серого.

3.00

48 OSp. 12390 8/100 (86,00-86,05) (H.V.)

47a OS, 2389 (85, 90-85, 93) (F.M.)

49 05, 2381 (86, 83 - 86, 90) KK

0,10 арифметич., середнє арифметичне

8.15 чертёж, кинематический, ортоси-

0,40 айыры мин, минерал-го сүзүм-

всплывающий, в. брезней и сн-

жний, зер.-сер., с доярчийта-

49a 05, 12392 (87, 80-87, 85) (E.M.)

 $11,95 = 2,00$

0,20 мкм, слабо аморфно-
мной, буровато-красной с зер-
новатоструктурным изгибом
которое иногда состоит из
более крупнозернистого и более
всплошного аморфного, илюминированного
сильно пестрого

065 сибиромит средне до
крупнозернистый, мелко-мале-
тый в верхней, 0,10 зернисто-
молочной основной буровато-
молочный средне до мелко
суглинистый.

$$88,90 - 91,90$$
$$1,25$$

0,30 (+1,00) неочищенные, олеиновые, мелкозернистый, разового употребления, тонкобросоватый, ароматический.

50 05p. 2393 (89,08 - '89,13) (H.V.)
(0,18 - 0,23)

0,60 аллювий, в верхний 0,30
среднезернистый, мелкозернистый,
красновато-бурый, в нижней части
переходящий в глиновато-серый круп-
нозернистый, с мелкозернистым
гид. уровне 0,60 - 0,65 в круп-
нозернистом глиновато-аллюви-
альном верхелегавшем фрагментах под

504. 2394 (90,50 - 90,55) (E.M.)
0,60 - 0,65

0,35 (+0,75) неочищенный, очень мелкозернистый, средневысыхающий, ровный, светло-серый, без примесей, красновато-бурый.

91,90 - 96,30
1,20

D₂ ar

D₂ m

(H, 40) - 45 -
0,40 - неясно, мелкозернистый,
мелкозернистый, розовато-серый, мелко-
зернистый
08р. 51 (2395) (92,20 - 92,25)
(0,30 - 0,35) (A.T.)

0,10 - мерил, серовато-ороме-
нов, с мелкими прослой-
ками алеврита, зелено-го
по цвету

0,05 (+0,89) алеврит, с мел-
ко-го мелкозернистый, в верх-
ней части буровато-красный, в
средней части буровато-серый и
мелкий песок розовато-белый с
редкой окраской, в средней и ниж-
ней части алеврит более
крупнозернистый

0,10 мерил, ормоме-нов, в
0,55 алеврит, средне-го мелко-
зернистый, беловато-серый, с зелено-
ватым оттенком, мелкозерни-
стый, в средней части
содержит ормоме-нов

52a 08р. (2397) (96,05 - 96,10) (E.M.)
1,95 - 2,00

52 08р. (2396) (94,55 - 94,60) (H.V.)
10,65 - 0,70

96,30 - 98,00
1,60

0,05 мерил, буровато-красный,
0,07 голубой, мерил, с
ормоме-нов, мелкозерни-
стый, средний
0,32 мерил, ормоме-нов, с
мелкими буровато-красными
или, мелкий 0,05 буровато-красный,
серый

98,00 - 101,70
3,25

0,52 амброзия, черно-го
пигментный, темно-серый, с зе-
леноватым оттенком, при
аэрировании.

0,64(+0,10) мери, орнотомо-
серый го темно-зеленоватый
при аэрировании до 80°

0,25^(+0,10) амброзия, принозрительный,
зеленоватый, в микротекстуре
кавернозный

0,40^(+0,10) мери, сероватый, го
серо, с зеленоватым оттенком,
мелкозернистый аэрированный

53 08. [2398] (98,70 - 98,75) (A.T.)
10,60 - 0,65

0,30 мери, амброзия, ду-
рочная, с зел.-серым от-
тенком и прожилками

0,70 амброзия, в верхний слой
(0,20) принозрительный, темно-ду-
ров, при аэрировании до 80°

(0,20) переносимая прино-
зрительный зер.-сер. амброзия
с буроватым оттенком с мелкозер-
нистой амброзией.

на уровне 1,20-1,40 от поверхности
под.

53. [2399] (99,40 - 99,60) (E.M.)

0,75(+0,25) мери, орнотомо-
вый го зеленоватый, в
микротекстуре (0,20-0,40) сильно
мелкозернистый

0,12 амброзия принозритель-
ный, зеленоватый

0,23 мери, амброзия,
буроватого цвета

0,50(+0,10) амброзия, принозритель-
ный, аэрированный, темно-ду-
ров.

101,70 - 105,00
2,10

0,15^{0,10} алев-ро-мн, крупнозер-
ни-и, зерноватосрой. -49-

0,93 (+0,30) мерель, опнолен-
тов, зер.-срой и бзроу-
мофноленовый.

На уроне 0,45 температур-
носной 0,03 золотина де-
лого, крупнозернистостенно

54 2400 (103,25 - 103,30) (A.T.)
(1,15-1,20)

55 2401 (103,70 - 103,75) (H.V.)
(1,60-1,65)

1,02 (+0,80) алев-ро-мн, береме
0,30 зерноватосрой, крупно-
зернистый, крупный, мелко-
бзроу-мн, алев-ро-мн, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый

105,00 - 107,30
2,20

0,05 мерель, опноленовый, алев-
ро-мн, мелко-
зернистый, крупнозернистый,
мелкозернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый

0,20 алев-ро-мн, крупнозернистый,
мелкозернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый

55a 2402 (105,15 - 105,20) (E.M.)
(0,15-0,20)

0,50 мерель, мелко-
зернистый, бзроу-мн, алев-
ро-мн, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый, мелко-
зернистый

56

1,45 (+0,10) амброзия, берес-
 ние 0,10 зер.-аром, а также
 миним 0,30. В середине ~~то~~ дан
 под уром 2403 10,95 - 1,00 (A.T.)
 (H.V.)

107,30 - 108,30
 1,00

мерило, в бересн расн чем
 розово-белосерый, в фазе рас-
 ния переходим в белую фазо-
 листовую, в миним минно-
 фазо-лиственной и красновато-бу-
 рой, мериле орудие косил
 под углом 90°.

108,30 - 112,00
 3,25

0,25 мерило, минно-орно-лиственной
 анаморфизм
 0,40 амброзия, зерновобелосерый
 крупнозернистый, с ромбическим
 минно-лиственным
 1,45 (+0,45) неостан, очень ми-
 но-зернистый до минно-зерни-
 стый, розовато-бурый, минно-ко-
 сический, ароматический минно-
 косический, доминирует крепко сук-
 кенно-лиственной, в миним рас-
 ния слабо суккентно-лиственной,

57 Одр.

2404 (110,30 - 110,40) (A.T.)
 (2,00 - 2,10)

0,70 мерило, орно-лиственной, ми-
 ним, мериле орудие косил
 под углом 90°.

0,40 амброзия, крупнозерни-
 стый, зерновобелосерый в мин-
 им расн переходим в
 неостан, очень минно-зернистый,
 крупно-лиственной

112,00-115,70
3,30

0,05 пшеница бурбачко крас-
ная
0,10 пшеница, ориза многозер-
нистая, с зелено банном ди-
маном, красно ориза многозер-
0,20 пшеница, многозернистая
до бурбачко красная
2,05 (40,40) пшеница, много-
зернистая, позднотрав до
позднотрав красная, много ориза
мной, ориза мной, ориза до
красно ориза много банном,
пшеница 0,20 красно ориза и
мной 0,05 пшеница.

58 05р. 2405 (112,35-112,40) (H.V.)
10,35-0,40

59 05р. 2406 (113,35-113,45) (A.T.)
11,35-1,45

60 2407 (114,10-114,15) (H.V.)
(2,10-2,15)

0,15 пшеница, ориза мной,
бурбачко красная, с мной
ориза мной
0,30 ориза мной, ориза мной
мной, много ориза мной, бур-
бачко до ориза, в верхней части бур-
бачко мной, красная
0,25 пшеница, мной, красно-
ориза,
0,25 ориза мной много ориза
мной, ориза красно ориза
с мной ориза мной мной
ориза, бурбачко.

115,70-120,20
3,05

-55-

0,15 неоранне, микозерни-
стый, дубово-мускусный, пори-
занный мускусом, крепкий.
0,15 аиром, микозерни-
стый, дубово-мускусный
0,95 (10,45) неоранне, микоз-
ернистый, розово-го фито-
нотодубов, монотонный,
ароматный, некрепкий,
средне-сладкий.
для удачи 0,73-0,76 про-
цента аиром, аироду-
ро.

61 05р. (0,30-0,40)
2408 (116,00-116,10) A.T.

0,25 аиром, микозер-
нистый, монотонный, аро-
матный, некрепкий
дубово-мускус

0,20 неоранне, аиромный,
фитонотодубов

0,10 неоранне, микозерни-
стый, ароматный, некрепкий,
крепкий

62 2409 (117,85-117,95) H.V.
(11,70-1,80)

0,25 аиром, монотон-
ный, фитонотодубов,
ароматный, некрепкий

1,00 (+1,00) неоранне, средне-го
сладко-сладкий, ро-
зово-дубовый,

63 05р. 2410 (120,10-120,20) A.T.
(12,95-3,05)

120, 20 - 123, 70
0,85

-57-

0,30 (+2,00) туранин, микозир-
мечный, асцидианский, мосолюс
ный, пазобатобурий, средне го
среднеасцидианский

64 08p. 2411 (120, 25 - 120, 35) (H.V.)
(0, 05 - 0, 15)

0,20 мерные минералы,
микрофосфоритов, микро-
сероватки, минералы, про-
цесс

0,15 черная доломитовая,
сильнокристаллическая, светлая,
хрупкая

0,20 (1 + 0,65) сирого цвета, круглоз-
начный, зеленовато-серый, с
мелкими прожилками, с
мелкой зернистостью

65 $\text{Opn. } \boxed{2412} (122, 90-123, 00) (A, T)$
 $(0, 70-0, 80)$

123,70 - 128,40 (100) 0,50 мерен, мисрнн, крас-
1,15 нобено дурнн, зм. снрн, в ннн-
ннн пннн прнбннннн, дурнн
нннн

(+0,55) 0,15 арелпарум срезне зрине-
муну диноцерви с зинкова-
муну оуменасом, муну
опаруменор лингва.

(+2,00)0,50 перил, минимальный, кист-
роиз, с возможностью замены

$$\begin{array}{r} 128,40 - 131,30 \\ 2,85 \end{array}$$

тупица, неширокий, посредине имеет
оросительный канал, между
ним и боковой частью с серым
пятном, темным, в расхо-
де в нижней части, серый
В нижней части

-59-
місце оврагу горо мн-
нижнього.

60

осп. 2413 (130,80-130,90) A.T.
0,40-0,50 см (г)

H. Viidingu proovid Valguta puuraugu
Devonist. 1960.a.

Sügavused

66.50-69.50	pr.38	pudd. linn Lu hõr
69.50-73.00	40	Lu
73.00-76.10	43	Lu
76.10-79.20	44	Lu
79.20-82.30	46	Lu
85.70-88.90	48	Lu
88.90-91.70	50	Lu
91.90-96.30	52	Lu
101.70-105.00	55	Alur
112.00-115.70	58+60	Lu
105.00-107.30	56	Alur
115.70-120.20	62	Al. Lu?
120.20-123.70	64	Lu

Laanemetja p. a.

Kast 31

ar

180.25 - 194.55 lüvakiir:
pruunikaspinane 50 meet. kõrgust,
kohati pudes

Kast 33

ar

+ 2.60
216.50 → (2.40+) ilusti 0.20 halli
tuumat. lüvakiir:
allpool murelid, veldavalt
hallid, pruuni- või violeti
kaskirjad vahelduvad
hallikasvake mureldole-
misi. valgetidega (15-20
cm paksused)

Kast 41

+ 4.10
259.90 → (0.90+) murelid, hallid,
kohati violetikasirjad,
murelites 4 Tassum k.a.
2cm paksused valgete
kisk. kipsi vahetite

Kast 43

+ 3.00
267.80 → (2.00+) murelid, veldv.
hallid, kohati Tassol. pruun-
id, hallide laevadega
kohati mureldolemurelid
hallid, kohati Tassum o.d. 1cm
paksusega kipsi vahetite
otom. kisk. Tassu k.a. k.a.
kipsi n. ka paksused

Kast 45

+ 0.50
276.15 - 279.15 hallid murelid,
vahelduvalt veldale-
mureldole
279.15 - 287.95 aluses 0.10
murelid, hallid, siis roosa-
kaskid, kaskid. Tassum.
lüvakiir, siis 0.50 tuumet.
halli Tassu, 0.20 Tassum.
lüvakiir, 0.15 hall murelid,
0.20 lüv. 0.20 halli Tassu.
0.10 murelid halli- violeti
kaskirjad 0.10 Tassu, 0.15
lik 0.40 Tassu, lõpus
0.15 halli lüv.