

Kõnnu, Rumba, Valgu (S. Jõgi, H. Stumbari, HN.)

Llandoveri Lääne-Eestis

Rapla lehe p.a.
(S. Jõgi, H. Stumbari järgi)

Kõnnu = 300

Rumba = 304

Valgu = 303

KEIN EINASTO

PÄEVIK 29

SISUKORD:

1. Kõnnu 300 puuvauk 2-16
2. Rumba 307 puuvauk 27-30
3. Valgu 303 puuvauk 40-42

Llandoveru Hääne - Eestis

Rapla lehe p. a.
(S. jõe, H. Stamburi järgi)

Kõnnu = 300

Rumba = 307

Valgu = 303

Скв. № 300 (Косы)

по с. Лови, X. Студыр, 1967

Рос. отсечка устья: 55.5 м.
Местонахождение: в 7 км на ЮЗ от
см. Диганье, в г. Косы.

0.00 - 7.80 Пембермурсе отсечка

Горизонт Араха (S₁g)

7.80 - 22 10 Известково-меловой горизонт,
серый, мелкокристаллический, коли-
коватый до средне-го молочнобелос-
мол мелкотрещотчатый, ретикуловый, grano-
генной чешуйчатости, от которой
остались мелкие и крупные зерна
длинной формы и молочнобелым
- до 20 см - прослойками чернотел-
лого горючего, вогнут горючим
зрелостию мелко-серой прослойки
нефеля.

Мелкие ПП на м.

- II - 11.70 - дугинская мощность 4 м.
- II - 13.30 - дугинская, волсинская; мощность имперсанта 4 м.
- III - 13.70 - волсинская, имперсанта до 4 м.
- III - 13.83 - волсинская, имперсанта до 4 м, далее скелетные мелкие пра-
вильной формы веретенообразные
голов черепицы и заплата
мелкая Тривасиле, глина до 1 см,
мелкой 2-3 см. до этой ПП 2-3
см - вторая, дугинская, карман до 2 см.

27.70 - 28.00 —
0.30

28.00 - 28.11 —
0.11

28.11 - 28.86 —
0.75

28.86 - 36.60 —
7.74

24.93 - 25.70 — порога разгнущена
26.60 - 26.67 — метадендритный алевро-пеллиговит,
коричневого-серый тонкозернистый текстурный
с серым тонким мускелем ходом
и пегм.

Тонкозернистый известковый голубой тонкозернистый-мускельный коленчатый текстурный, светлые мелкие асимметричные зерна коинки переходящие с мелкозернистым известным коричневым голубоватым переливом, на контакте коинкелем и-рита.

Голубоватый перелив тонкозернистый, довольно массивный текстурный.

Доломит известковый. мускельные светлые-розовые сильно коленчатые тонкозернистые мускельные переходящие с коричневатой тонкозернистой прослойкой метадендритом и переливом, часто мускельнозернистые. Более темные прослойки метадендритов на м.

28.31 - 28.38,

28.47 - 49

28.53 - 57

Доломит известковый-мускельный тонкозернистый с светлыми мускельными коинками и прослойками отмирающей бивернозернистой окраски и руды. на м. 30.0 и.

Каверна по руде занята известным белым карбонатом голубоватой мускелью (окрепшая).
33.60 - 33.75 — адраситовые тонкозернистые сленки драконоз с грав. 1x1.5 до 2 см.

36.60 - 38.10 —
1.50

38.10 - 38.80 —
0.70

38.8 - 41.8 —
3.00

41.80 - 41.88 —
0.08

41.88 - 42.08 —
0.20

5
Мериди голоушовой, ренносерной кососеменной
ректур, без оканчивающей.

Мериди голоушовой ренносерной коинковатой
средне-го ренносеменной ректур с промной
канди серой микс.

Мериди голоушовой, ренносерной с про-
мной канн аегаденноса на м.:!
39.80-86 — неинтово-аебрушовой сруктур,
~~неинтово~~ кармиево-серой с ренно-серной
мисингом хогамм ивсего
40.90-93 — неинтово извеса, неинтово-аебрушовой
сруктур, коричной, корично-голубой
носеменной ректур, с оканчивающей канн.

Пиримизированная промная боинго-букне-
рад ПП с мидной карманов 1-3 см,
моуноного имперкануи 3-4 см.

Горизонт агавере (S, ad)

Рудаская парка (S, ad R)

Известково-мисингой голоуш, серой рен-
кокрисанмический с коинковатой ренносемен-
ной ректур с ренно-серной мисингой-
ли промной канн.

42.08 ППП ровная с вермиканнелен
правильной и неправильной ородами до-
гали, мидной до 3 см, шириной 3 см.
Букна имперкануи 3-7 см. В мисинге
заси карманов имперкануи осязывает
расора карманов мисинге 3 см на 10 см.

42.08 - 42.16 -
0.08

42.16 - 42.22 -
0.06

42.22 - 42.40 -
0.18

42.40 - 42.46 -
0.60

42.46 - 42.76 -
0.30

42.76 - 43.11 -
0.45

43.11 - 43.85 -
0.74

Доломит негритый кремневого-серого цвета, извест-
ковистого среднезернистый с нефтяным запахом.

Меридионный доломит кремневого цвета
тонкозернистый мелкозернистый
амфиболит с реликтами перлого бруска
(мелкозернистый).

Доломит кремневого цвета, тонкозернистый
слиши тонкозернистый мелкозернистый. Ровные ППП:
vvv 42.40
vvv 42.43 - 2x, имприманция 1-2 мм.

Доломит, с имприманцией коррозийными хо-
ди и изломом имприманции до 2 см - вертикаль-
ные и горизонтальные, заполненные мелкод-
зернистым.
vvv 42.46 - ППП брусчатая, мощность импре-
танции до 3 см.

Доломит ринкловый биморфной структурой
кавернозистый, каверны образуются по круп-
ным раковинам *P. estonus* (глад. до 5 см)
с тонкими меридионными долами красно-серо-
го цвета и прослойками меридиона.

Доломит известково-мраморный негритый,
в верхней части 0.20 м дола красно-серого
тонкозернистый в нижней меридионный изло-
мистый на м.
? m 42.85-90 с мелкозернистым кремневым
хозяином излом - канонический и/о.

Доломит меридионный красно-серый тонко-
зернистый мелкозернистый прослойки мощ-
ности менее 1,5 см переизогнуты с линза-
ми и прослойками светло-серого биморф-

ново известнякового горизонта с кавернами
бузенамбанами раковин Pentamerus sp.
расположен горизонтально криволинейно изгибается
и хвостиком выгнут мелких грибовидов Zueri-
nurus sp.

Весьма первый раскоп по горизонтали безвосточной
линии. На горизонте мой с пер-
вым аргентово-голубым раковинами - кон-
версия. Также много толщину до 1 см,
густоты 3-4 см. В раковинах отмерзших по-
сле беркуловых хвостов черепица оккуп-
ной горной с густотой 2 см. Основная
масса перемещена многократным
кремованием с многократным мо-
ем раскопником X/м, заново сдвинутым
этим минералом.

Меридионный тусо-серый тонкокристаллический
горизонт с характерной изломанной текстурой,
образованной в основном изгибанием известняков
горизонта, толщиной до 2 см. Меридионная основ-
ная масса перемещена многократным
моющим тонким кремованием X/м. -
диаметром изгибается.

Доломитовый меридионный мелководно-свежо-серый
тонкокристаллический пористый
с многократным горизонтальным мо-
ем X/м.

Бюрогорский до изгибания мой
тусо-серый, состоит из первых аргументов.

? Tugikentinit

43.85 - 44.13

0.28

44.13 - 44.21

0.08

44.21 - 44.22

0.01

44.22 - 44.87 —
0.65

44.87 - 45.90 —
1.03

45.90 - 47.05
1.15

Белоземская марка (S₁ ad V)

Доходный перел. темно-серый угловатый
песчан. В верхней 0.30 м со дробным из-
вестковым муском муском с много-
численным тонким белым и напор-
нобным перловым кварцевым муском.
В нижней части биморфный, с бугоро-
выми раковинами.

Перел. доломитово-муском в верхней
части темно-серый более муском в
нижней еще с муском известкового
доломита. На м. 45.10 конcretion муском.
45.42 — биморфная брахиподовид муском
и бугорок, перел. 1-2 см прослой перел.
прослой с темным муском муском
или прослой тонким 1-3 мм гни-
лой темной м. В слое раста враще-
ность муском.

Рудавская марка (S₁ ad R)

vvv 45.90 — ПП ровная перлая муском-прос-
лой. Муском перлой муском
до 1-1.5 см. От поверхности бугорок исхо-
ят неправильной формы карманы муском
перлой в угловатой части 1-1.5 см
муском и муском до нескольких см.
с враще-ность муском.

Известково-муском доломит кармано-
вый перлой серый с тонким до 0.5
см неправильным прослойкам извест-
ково-темно-серого доломита. С перлой-
ми ровным ПП на м.

vv 46.05 — муском. муском до 1 см. Пор-

м. полн. а.

- vv 46.20 - левоберманская в биге мунг
- vv 46.30 - " "
- vv 46.45 - дунская (глобная, тройная)
- vv 46.90 - глобная мунгского империям
- 401-1.5 см, м. капианов 2 см.
- vv 47.05 - боуниная более младая, мунгское империям 3-4' см.

47.05 - 50.30 -
3.25

Тунинго - известковый голубой тонкоунос-
таммеский кобальтовый персидский переселен
тонким темно-серым просвечивающим голубым
боло переня. Переселение осые законодир-
ное за 0.5 - 1 см просвоя переня сущей
0.5 - 3 см просвоя дейного голубого Кабер-
нозний по раковинам маленьких Pentame-
ris sp. и кориневагоуи (керосинистый) X/ид.

ПП на м.:

- vv 47.20 - 22 - глобная дунская с тонкой 1-1.5 см мунгоуи империям.
- vv 47.65 - осые младая тонкая дунская.
- vv 48.10 - " " " "
- vv 48.70 - перкая дунская, мунг. импер. 1 см.
- vv 48.95 - перкая с персидским мунгем какади.
- vv 49.00 - перкая дунская.
- vv 49.25 - средняя дунская.
- vv 50.00 - глобная дунская
- vv 50.15 - " "
- vv 50.30 - глобная с опракиеталии кривоней.
- vv 50.30 - перкая осые сильно мунгизирован-
ная с лефамеским мунгоуи полн. а.
с персидской империям 1-2 см с
вертикальным просвечивающим голубым хо-
гади Trypanites 6-7 на 10 см.

50.30 - 52.20 —

1.90

52.20 - 52.40 —

0.20

52.40 - 52.85 —

0.40

52.85 - 53.90 —

4.05

Доломит кремеватый тонкокристаллический, пересечен изоморфизмом зеленоватый мик-
ским X/ид. шириной 3-4 мм. Хвост распо-
ложен горизонтально и по толщине бо-
льшей, чем в продольном направлении. В верхнем
0.20 м слое с изоморфизмом и изоморфизмом
наполненных тонких акриловых нитей 1 см
сверху имеет тонкую желтую пленку.

Слой 0.20 — более мягкий; 0.20 — более
плотный. Кремеватые акриловые волокна
представляются как-будто мелкие Pentamerus sp.

51.15 - 22 — порода более мерцательная, зелено-
ватая-серая.

В косе изт. 0.30 м кремеватый мягкий
тонкокристаллический доломит с зеленова-
тым X/ид.

Доломит кремеватый тонкокристаллический
мягкий, толстолистовой с желтым мер-
цательным X/ид. и изоморфизмом кристаллов.

Доломит кремеватый мягкий до мелко-
ватый изоморфизм с белым изоморфизмом
базисным и поверхностью перерыва
в 52.4 — дуристая
в 52.45, 52.50, 52.60, 52.75, 52.85.

Доломит кремеватый тонкокристаллический,
кошачий тонкокристаллический, кавернозный с
желтым изоморфизмом изоморфизмом
Сильно выраженные разрывы ППН:
в 53.50 — очень редко расположенные (вспра-
вочной формой карманы) нити до
3 см. — в 53.50 — 0.25 м — с желтым

vv 57.97 - мокрая, но хорошо расчлененная
 vv 58.27 - " " " "
 vv 58.84 - " " " "
 vv 58.30 - " " " "

vv 59.10 - буристая с расходом 1-1.5 м ров-
 ным вертикальным ходом

vv 59.32 - " " " "

vv 59.50 - ровная пёстрая, с первыми форага-
 то-тигровыми мотками палками.

59.50 - 60.28 -
 0.78

Доломит тонкокристаллический кремнистый улея
 сильно колкватой текстурой, местами похвещ-
 брекчи. С кремневого - темно-серыми латекса-
 ми мурен, по которым светло-серые тон-
 кие извилистые X (м. ϕ 1-2 мм).

ПММ:

vv 59.60 - сильно расчлененная, изв. ходы доходя
 до м. 2-3 мм.

vv 59.75 - ровная

vv 59.85 - ровная с расходом незначительной про-
 ды ходом ϕ 1-1.5 см.

vv 60.05

vv 60.18 - ровная

60.28 - 62.00 -
 1.72

Доломит кремневого - светло-серый тонко-го
 мелкокристаллического, тонкопористый, матовый
 волнистый с чередующимися тонкими тем-
 но-серыми латексообразными полоса-
 ми.

62.00 - 62.20 -
 0.20

Доломит темно-серый тонко-го мелко-
 кристаллического, разрывистой.

62.20 - 62.40 —
0.20

Доломит желто-серый мелкопористый, мелко-го среднекристаллического, толсто-го среднекристаллической массивной текстур. Толсто-го 62.30 - равная ППП

62.40 - 63.70 —
1.30

Доломит кремоватый разнокристаллический комковатый среднекристаллической текстур. Встречаются прослойки опраделеной средней кристаллической и тонкой мелкокристаллической прослойки мергеля карбонатного. Спромагаторы кавернами, опраделеными кристаллами.

63.70 - 65.40 —
1.70

Доломит разнокристаллический желто-серый мелкокристаллический толстокристаллической со средней полосами кавернами с диаметром около 1 см составляет до 25% породы. Толсто-го 65.40 ППП с правильной формой кристаллов.

65.40 - 68.10 —
2.70

Доломит белый тонкокристаллический мелкопористый мелкокристаллической, с тонкими тонкими зеленоватыми прослойками мергеля, количество которых в тонкой части несколько увеличивается. В тонкой части и редкие крупные каверны и конкреции мрамора. Толсто-го 67.20-28 коринтеватой прослойкой голо-мраморизованного метадентонита (мрамора). Толсто-го 67.80 равная поверхность покрытия коринтеватой мергелем с перхонией опраделенными гранулами.

68.10 - 68.70 —
0.60

Доломит разно-мрамор-го мелкокристаллического мелкокристаллической, составляет до 20% породы. Толсто-го 68.10 белая мелкокристаллическая конкреция - в основном по спромагаторам, с конкрециями мрамора.

68.70 - 68.74 —

0.04

68.74 - 68.78 —

0.04

68.78 - 70.00 —

1.22

70.00 - 71.20 —

1.20

Доломит (метаморфизованный) коринтеватый, порфироидный, мраморный с тонким железистым и асбестовым рисунком и мелкозернистым тонким перемешанным хогом исланд.

Доломит мелко-серый с глянцем буржестым, полупрозрачным цветом.

Доломит светло-серый, белый, порфироидный, мраморный, порфироидный или порфироидный мраморный, асбестовый, кебернозный, кеберный, заходящий, порфироидный, мраморный, ирисовый и голубоватый. Мрамор с железным исландом, бурым хогом - в верхней части, исландом и бурый мрамор окрашенности - в нижней части.

Москворасская марка (S₁ ad M)

Доломит кебернозный в верхней 0.5 м коринтеватый, порфироидный. С железистым хогом и исландом.

vv 70.50 } буржестые железосерые ППП

vv 70.62 } Исланд полупрозрачный 0.30 м порога белосерый. Под полупрозрачным отмерзшим кеберным, заходящим крупнокристаллическим молотковым голубоватым, бурым периметром мраморным периметром.

Порога мелкокристаллическая. Порог и кеберный составляют до 20% порога.

На основании порога исланд коринтеватый, отмерзший сподожонор.

vv МПП отмерзший в нижней коринтеватый

vv раск - на кровле и на м. 69.80 м.

и в среднем 70.05 м - очень гёркая, хорошо выветренная, наг помегней сроднообразн.

71.20 - 73.80 -
2.60

Доломит мелкокристаллический, пёклого цвета с рёсно-серыми горизонтальными полосами и линзами и прожилками. Пресе крепкие, мелкокрист.

Порог сожальной до 15%. Отмерстой де-мел окремнённые конкреции.

73.20 - 73.40 - порога кавернозная по окраске-ности. Конкреции с гмалитром до 6 см пересекатой сном. В интервале отмерстой коринтевые тонкие прожилки мурчиде ла основанит 0.22 и доломит рёсно-серый - во ла пожоме сродо бурнотар ППМ.

Порозон Райккюла (51 км)

73.80 - 80.00 -
6.20

Доломит кремового цвета разношерстн по-мощнй кварцеватой рексуре с рёсно-серыми полосами бурнотным кофуратим. Покло-но неспра от муртнзурованисне х/м. и окрасенности, поклоно и кавернозные.

74.25 - 35 - рёсно-серый с кремватоним х/м. |
Возможн с месо сохр. глыня ППМ,
бурнотним

74.35 - 45 - рёсносерый крупнокристаллический, порнфокернозный.
- 75.05 - с рёсноим муртнзурованисне хога-им и бурнотн поверхносто, глотиде

77.30 - 40 и 77.60 - 75 - неспра от муртнзурим.
78.80 - 95, 79.60 - 80 и 79.90 - 80.0 - со белым кремв. х/м.

74.35-39 - дежно-серый кремневатый кварц-
возникновение по дисперсионному
распределению конформации

в 80.00 - волнистая бурная темно-серая ПП

73.90. 74.9. 75.1. 75.6. 78.3 - крупные белые-крас-
ные включения.

Слб. 307 (Рында)

Адс. оймака ушма: 6 м
 местонахождение: в 100 м, на ЮВ от
 разветвления рек Косовере и Тусеце

Рембертурская оймака

Оймака Балчицкого лев. озера (лж. III-V)

0.0 - 10.0 -
 10.0

Тина коричнево-серая, известковая с ред-
 кими раковинами и балками известняков

10.0 - 11.3 -
 1.3

Балки и балки известняков и известни-
 ских пород с примесью мусора.

11.3 - 16.0 -
 4.7

Тина коричнево-темно-серая озерная.

16.0 - 25.0 -
 9.0 - (2.0)

Тина более зеленовато-серая, известковая,
 с балками и раковинами известняков и
 головаста.

25.0 - 29.4 -
 4.4

Известняки головасто- и головасто-ни-
 ские, светло-серые, орнаментированные го

Андреевская оймака
~~Томасов~~ Агабер (S, ad)
 Рындакская оймака (S, ad R)

29.4 - 29.6
0.20

Рыба:

- P. esthonus* Eichw.
- F. gottlandicus* Lam.
- Bythocypris diffusa*
- Chilobothris* sp. nov.
- Bythocypris longa* Stumbr.
- Bythocypris lubrica* Stumbr.
- Ecdinacidium microstegiatum* Nestor
- E. festigiatum* Nich.

29.6 - 38.0
8.4

Дисморфной структуры. Коричневые разноманетные, пережидые пропояканы зелено-бато-серого или коричневатого коричневого цвета мощностью 1-3 см. В верхней части 10.5 м, раковины крупных *Pentamerus* и более богатые содерма и сформаторы и несколько меньше радиусы. в 28.5 - много бурная ППП.

Метастрофия кремовой, алебастровой структуры, много коричневатых, а также желтых, коричневых и основных окрасок, мелких раковин, дюжины. Состояние раковины около 15%. Остатки раковины *Pseudolingu* la sp. и других брахиопод. В нижней части мощность X/м.

Известны городишко-мусорные черные, оранжевые, коричневые, особенно с богатой содермами желтого, коричневого с пропояканы зелено-бато-серого цвета и коричневатого метастрофия. По коричневатой пропояканы черной окраской в части мощные известняки X/м. в 29.0 } ППП, раковины, мощность мусора 1 см. в 33.18 }

32.2 Диморфный слой с крупными *Pestonica* мощностью 0.04 м.

35.30-35 - более мощный слой метастрофия раковинного с тонкими коричневатого-зеленоватыми ходами и раковинами. 31.7 м *Pentamerus* sp. Раковины сформаторы, радиусы.

38.0 - 39.9 —
1.9

Ильинскославская норма (S₁ ad M)

Известняки кремневатые, аскаригове, но-
сочно опаногетригове, конковатые, пере-
зудные прослойками, известково-серого
цвета, с мучками 35.5 и выше - ор-
паногетригове.

Кремневатые известково-меловые
прослойки известково-меловые с конками из-
вестняка и известково-меловым тонким
пересечением x/м. на мучках:

36.0 - 15

38.25 - 35

38.8 - 39.0

39.05 - 15

39.05 - 39.8

Районская норма (G₃) см. 38.6.

ППП на мучках:

38.6 - 72 - 5 ровных поверхностей

39.0 - 39.10 - дупцы

39.9 - ровная, пропущена известково-
меловая тонкая, x/м, известково-меловая
кремневатая и/д. и/д. покрывает ПП.
Знаки, в 3 см прослойка и/д. мелово-
меловая 1.5 см. М/д. содержит много-
меловую тонкую кремневатую x/м.

39.90 - 40.10 —
0.20

Известняки доломитовые, известково-серые
разнокристаллические (ср. 'го известково-мелово-
го). Известково-меловые тонкие и окре-
пленные известняки и известняки. Известно-
ра массовая, разнокристаллическая.

40.10 - 42.00 -
1.90

Известняки кремоватые с коринтеватости и
темно-серыми полосами морские орган-
огенные более мелкокристаллические.
Разношерстные, в среднем 0.65 м толщине-
стью, с грубой структурой. Буристые ПП

40.4 м, 40.5 м, 40.6 м (вокруг стратонора.)
41.9-42.0 - при слабых

В толщине части отмерзшей стратонора
В нижней части коринтеватые известняки
и раковины. Падубы, стратонора, раковины.

42.0 - 44.4 -
2.4

Известняки, переизогнутые темно- и светло-
серые крупнозернистые разношерстные со
структурой. Разношерстные, морские,
со структурами. Структурные, раковины.

44.4 - 44.6 -
0.20

Коринтеватый состоит из темно-серых
мелких раковин, крупнозернистого голубого-
вого известняка, среднезернистого светло-
серого пористого известняка, известня-
ков со структурами по структурам периме-
трально. Структуры тонкозернистые, зернистые
мелкой, зернистой, зернистой, зернистой, зернистой
44.4-45 - брахиоподы.

44.6 - 45.5 -
0.90

Известняки темно-серые, поистине круп-
нокристаллические, разношерстные, мелкокри-
сталлические (зернистые?). Структуры со струк-
турами по структурам, раковины, ра-
ковины, раковины, раковины, раковины.

Сек. 303 (Барны)

Адс. отлетка утка: 29 м
Местонахождение: в 13 км на ЮВ от с.
Барны.

0.0 - 4.0 —
4.0

Барышная цыпля

Торжон агаре (S1ad)

Рыдаккая нарка (S1ad R)

4.0 - 5.0 —
1.0

Известно голубиного - мускетера черн -
серые орнотезиного - разнозернистый
орнотезиного, утка - коммари перепел.
перепел, пролетел зеленато - серо
мускетера.

4.2 - пролет с P. esthonus Eichw.

В сериусе утка миска кремовато
роу 11/15 с белымосью душка. Иа
основании миска брахнозга.

5.0 - 5.9 —
0.9

Плотный мускет с мизаи и коммари
известно онкасиро буре. Иа м.
5.5 м - миска галки и мизаи, в 15
м миска дунопрофка пролетка, мус-
кетер 5 м - P. esthonus Eichw.
Иа основании 0.2 м мускет кремо-
ватый с галками мизаи как миска -
Торжон. Иа м. 5.1 м 2 пухоз.

5.9 - 6.15 —
0.25

Мускет зеленато - серый более пролет
с коммари черн - серо известна и с
миска брахнозгаи. Atypidae Sp.

0.35

1.70

2-60

В середине изг. гипотрофованная дво-
членная прокладка - ровная ПП и про-
кладка с порозонгальными гонками ϕ
мелее 3 мм х (мм. с корнями ствол
куператор. По 5 мм крупные острого

$$\begin{array}{r} 10.8 - 13.05 - \\ \hline 2.25 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 13.05 - 16.0 = \\ \hline 2.95 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 16.0 - 17.5 - \\ \hline 1.50 \end{array}$$

Max Kronacker marka (S₁ ad M)

Известные коралловые
1-2 м, и с черными
наиб. в ^{но} ~~всех~~
Ита м. 120.7 кривые Pentamerus estonus
и симметри.

Долгоплет, в средней части светло-серые пор-
ы белые, тонкокристаллические. На коровке,
0,5 м — коррозийные следы коррозивности!
На основании 0,5 м — тонкосерые Кабер-
нозные — 10%. Кабернозные мелкие квадрат-
ной формы 0,5 см. Кабернозность нараста-
ет выше в верхней части, на м. 15, 15.

Торғоңу Райкыла (S₁ ок)

Долгожданный полевой кремневатый или железно-серый, тонкокристаллический, сильно кавернозный, до 25%. Каверны образованы по окислению. Диаметр их в верхних 0.7 м, обычно менее 1-1.5 см, ниже достигает до 10 см. В массиве на поверхности образуются по радиациям и спонгиозным ракам. Оси крепкие.

16.2 м - ровная ППП, под ней кучеря-
вовая коринтевая доминантно-базальная про-
слойка мощностью менее 0.5 см.