S. MÄGI
PÄEVIK 70

Leedu
p. [illegible]

VÄHEMASTI LÕPUS ON
SCHEDAI 3 PUURAUK
kas algus ka on ....

TURINYS

Maršruto data	Maršruto Nr.	Darbų rajonas	Taškų Nr. nuo	Taškų Nr. iki	Puslapis
O_2 ls					
		делювиальноаллювиальные			
475,2-483,0		Мергель светло-серый, крепкий, плотный, равномернозернистый, в приобнажении среднеслоистой текстуры (до 1 м) за счет чередования слоев с относительно тонкими (мене 2 см) и более мелкими (1 см) прослойками слабо зеленовато-серого мергеля. Прослойки неравномерные. Поверхности слоев мергеля местами ожелезнены, местами слабо коллоидные. Встречаются бугристые бело-коричнево-темно-серые фосфатные пл. на высотах, см. от 0,15 м, 0,75 м, 0,80 м, 1,25 м и выше 2,0-2,3 м см. Одиночные фосфатные пл.			
7,8					
7,8					

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			в 3 м вала (3,0-3,3 м - 4 фрагмен- тах или. в более крепкой прослое окрашенных фрагм.) на высоте 4 м - также (4 инт. - На высоте 5 м наиболее лёгкая слоисто-волнис- тая или. и в кровле некарб. Соотношение известняка и мергеля 9:1.	
62			На высоте 1-1,2 м основа- ния - мелкие псевдоолиты.	
62	as			
4830- 2,8	485,8 / 2,8		Известняк доломитизирован- ный глинистый в нижней 20 см - слоёв глинистый. Пестро цветной. Ритмично чередует- ся серо-зелено- и фиолетово- красная окраска. Структура перекристаллизованная мелкодетритовая, в зел-	

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			товарных ил монтмориллонитовых	
	Слой		глинах и мергелях встречаются	
	мощн.		монтмориллонитовой (гётитовой) кварцево-	
	6/к		-доломито- представляющие	
			монтмориллонитовой окраски	
			окаменелостей. Они довольно	
			неравномерно рассеяны и	
			мелкие гальки всего слоя.	
			Наиболее интенсивно окра-	
			шенный красноватый слой	
			на глубине 0,7-1,4м сверху.	
			Желтые полоски представляют	
			собой слабожелто-бурые монт-	
			мориллонитизированные (гётитизированные)	
			или. Мощность желтой полосы	
			монтмориллонита достигает несколь-	
			ких см.	
			Известняк чередуется с тонкими	
			прослоями мергеля, мощностью	
			около 1см.	

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			В нижней части (0,3м) порода наиболее толстослоистая, глинефиолетовая, менее глинистая, богата трилобитами. В основании и кровле этой части тёмные зеленые глинистые п.п. Мощность измеряемой верхней, в кровле достигает нескольких см., в ней видна глинистая галька.	
	74.			
485,8 - 486,65	5		Мергель доломитизированный в верхней части пестро, - в нижней - красно цветный. С минералами и прослоями глинистого известняка доломитизированного мелкодетритового	
0,85				
0,85				

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			Желтовато-серая мелкозернистая доломитизированная по пологим пл.н. неотчетливая расплывчатая. В кровле интервала - двойная неглубоко-дугообразная пл.н., глубина кармана которых достигает нескольких см. Карманы заполнены вышележащей красной известняком	
			Встречены неровные тонкие корки мягкой, слегка окремнелости и прослойки зеленовато-серого доломитизированного мергеля	
	O_2	as	Сегерстадская свита	
486,65-490,65				
4,0 / 4,0		415	Известняк доломитизированный оранжево-красный крепкий, толстослоистый со средне- и тонкослоистыми прос-	

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			слоями. Встречаются темно-красные прослои (<0,5 см) и кора илювия. Верхняя часть 2,8 м более однородная, в этой части встречены округлые формы ок. Менепасъ (Echinospaerites?). В кровле песчаника (0,2 м) около 6 желваковых включений-бурых или, тонкие желтые или белые на гл. 1,15 м; 2,6 м, и 2,65 м. Но для верхней части 2,8 м в общем характерно отсутствие (кроме отмеченных) глауконита или. В нижней 1,2 м ок.	

ППП. п.п.п.

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
		D_3ar_3	?Ll	
cL.				
4965-4969			Известняк глинистый серый, тонкослоистый, мелкодетритовый, с тёмными дегтистыми. Перемежается с тёмно-серыми мергелями невыдержанной мощности. Часто видны остатки головоногих. Две прн. через 11 и 12 см с желтой минерализацией. Мощность цементации до 1 см. Рельеф пл. - слабоволнисто-бугристый. Кроме того видны фосфатные пл. - неровные. В интервале верха биотурбация особенно часто в ниж. прн. т. е. - в средней и верхней	
04				
04				

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Prabų Nr. ir paėmimo intervalas
			частях интервале	
		D1kn		
496	9-498,98		Нижний доломитовый слой	
6/6			известняк коричнево-серый крепкий, плотный обогащен мелкими коричневыми псевдоолитами. В основании и в кровле слоя тёмные доломитовые поверхности или неровные. Особенно тёмная с доломитовой коркой - в кровле слоя видны головоногие	
		D1vl		
498,98	9-497,3		Доломит зелено-бато-серый крепкий,	
32/32			плотный толстослоистый	

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas

Gręžiai 3 (Schedai)

1 : 10 1 cm = 10 cm
1 mm = 1 cm

515,3-503,3 (h. 4,0) kv. liūnakių volgo trement. kompl. sh.
12,0-4,0

503,30-498,24 (5) karni pok
05.06

498,25-498,05 6, pk Bas. dolomyt
20-16 Lt

4-2 — Lt - 1 mm

14-15 - Kloogi 5 mm

497,85-497,8 BII mergel 2 mm
5-6

22 - Don. α - 7 mm

17-18 } β - 6 mm
10

~~3~~-33 - ~~pK~~ - 10 mm
5-7 ~~β~~2 P - 2 mm
40 BIII ∝ L - 13 mm

496,5-495,35 β, V
1.15

495,35-493,5 Pokaunkn
1.85

493,5-492,5 Aleuro-dolit
1.0

492,5-491,3 Uchtelmiina
1.2

491,3-490,65 CI a
65

490,65-486,65 Segerstadt
4,0

486,65-485,8 Kaija
85

1,5 cm
9 mm ≈ 1 cm
3 mm
1 cm
15 mm 1,5 cm
≥ 5 cm
5 cm
1,5 cm
3,8 cm
6,1 cm
3,3 cm
4,0 cm

4,65
2,5
7,8
14,95

3,5
1,15
4,65

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis

$\frac{485.5 - 483.0}{2,5}$ lfk. krgn

$\frac{483,0 - 475.2}{7.8}$ $C_I b$

$\frac{475,2 - 465,2}{10.0}$ $C_I c$

$\frac{465.2 - 455.4}{9.8}$ kk

(kail 456,2) $\frac{455.4 - 442,5}{13 (?14.0)}$ id

$\frac{442,5}{4,8}$ ld

$\frac{437.7 - 435.9}{1,8}$ ok

6,8 ~~mk~~

6,5 ab

5.5 vrs

$\frac{358,8 - 419,0}{60,2}$ ms

$\frac{358,8 - 355,8}{\sim 3}$ msk

Uolienų kategorija	Sluoksnio Nr.	Geologinis indeksas	Uolienų aprašymas	Intervalas paėmimo Nr. nuo
			Schedai p.a (≈ Brukčiai)	
			$O_1 pk$ - 0,2 - 498,25 - 498,05	
			B_I 0,2	
			B_{II} 0,95	
			B_{III} 6,4	
			C_{Ia} 7,5	
			C_{Ib} - 7,8	
			uk - 10	
			kk - 9,8	
			id+ŋk - 14 (id+lo?)	
			kl - 4,8	
			ok - 1,8	
			ak - 6,8	
			nb - 6,5	
			M_2 - 24,5	
			M_1 - 7,3 - 400 - 382,7	
			$M_2 H$ - 30,0	
			F_{II} - 2,0	
			1985	

Bernardo H. Sruogos-tūjos kel. kerai 1938 g. Nauja Rovos kiaurymė, Ekstensi kiaurymė, kiaurymė, kiaurymė,