

(19)

1983?

Llandoverly
Jda - Eestis

Viljandi (422)

Viljandi (422)

Valley

1002101

h.k.

68.9 - 7

10/10/10

1944

18. *Chamaecyparis*

1452.

Vilandi (422)

D2

58-63,9

Kallide lõhn. ja pur. aegust.
roost. lõhn. vaheld. North alum.
pinn. osal. kulet. vältavaga. 10cm.-le
breitla kiht. Horisont. kühk. hirm.
(22m) Pür on kaon.

63,4-75,0

11,6 (0,9)

Ad. coll.-pr. (reserves) Louis t. pencksh.
LK.

2! 68,3-73,0 — pole kārni

Idari ~ 20 cm. Bol. - lall mikrokrst.
 varikes dalam. N. l. m. pasles brijalede
 kenglen. N. l. m. < 1 cm → pulvis, paktam
 det m. d. l. m. d. l. m.
 et l. m. p. l. m. k. l. m.

S_1 ad l.?

75,0-77,2

$$2,2(1,4)$$

Долготинир. Денко-христ. Зинков-
свето-серия. Любовин. Звал-ме
платками зин. денерия (~ 3 мм)
и еррор. - ми не отсор. мисел.
депирново слабоверн-го дрочен-ме.
Мобил. до 2 см.
(Пенпамеридер?)

77,2-79,5

$$2, 3 \quad (2, 2)$$

Должн. Черд. в. Д и Мрова. Доло-
Крив. Топного с должн. кавер-
мозной миско до мрдономм лекта-
мрдовин. Моз. каверы. — 30 см, плот.
5-15 см. Митервадсем каверы. Д
в стрелко дабулати.

78,6₈ - 78,9

78,6₈ - 78,9 Max. кавыч. В середине интерв.

79,5-83,8
4,3 (4,3)

Должн. акад. измер. 75,0-78,2
Визу раст. измер. пред. песч.-
песчаный. Черз 0,5 см. (~30-50) просел.
10 см. просел. измер. - акад. ин-
струмент. измер. 75,0-78,2. Черз 0,5 см.
просел. акад. измер. 75,0-78,2.

83,8-87,4
3,6 (3,6)

Мак. мон. и зерн. 5 мм. 81,7-82,0
Визу раст. измер.
Д. дождя до малко крупн. кр. крупн. - по-
песч. - серый. Зерн. волн. акад. с
жонк. прерыв. просел. см 2-60 дене-
жна. ~~Мон. 2 см. в акад. измер. 5-10 см~~
акад. измер. 5-10 см. просел. акад. измер.
Д-а. 2-5 см. просел. акад. измер.
Верх. раст. черз 25 см, в акад. измер.
5-10 см. просел. акад. измер.

87,4-89,0
1,6 (1,5)

Визу раст. измер. 87,4-89,0
Д. дождя до малко крупн. кр. крупн. - по-
песч. - серый. Зерн. волн. акад. с
жонк. прерыв. просел. см 2-60 дене-
жна. ~~Мон. 2 см. в акад. измер. 5-10 см~~
акад. измер. 5-10 см. просел. акад. измер.
Д-а. 2-5 см. просел. акад. измер.
Верх. раст. черз 25 см, в акад. измер.
5-10 см. просел. акад. измер.

89,0 - вода для 03/11 изгнание -
лемме гав ланаман

89,0-95,5
6,5(6,5)

Д. мин-ный мелко-зер-ный
срез мелко конково-мелкой зелёной
земляк. - сероватый дождик-оск.
Мощ. ~ 0,5-2,0 (-5 см).
Соотноше. 3:1 - 1:2. Мех. свойства
от 92,7 до 93,1 (93,6)
Верх. - минер. ленте среза - конков.
Минер. мезо-зер. мезо-зер.
мезо-зер. мезо-зер. и характер.
(вкл. - средн. - оск. текст., 2:1 - 3:1)

Ка. мч-89,8

Темпер. 91,3

31,7

94,9

95,3

95,5

поверх. перерыва
поверх. порога мезо-
зер. мезо-зер.

94,9 - 95,5 - полученов. бз. не-от.

Житная гр. разная сложенная
ровная двойная ППП с крупными
карманами, разветвляющийся. Фракция
мезо-зер. мезо-зер. и
"мезо-зер." и "мезо-зер." и
"мезо-зер." и "мезо-зер." и
Гр. IV и V мезо-зер. (по X. Перинс).

95.5 - 104.8

9.3

8.5

Доломит, толсто-широколистая,
коричнево-серый, неравномерной
поверхности

Мягкость - Заправильно волнисто-среднеплотная
с рудными включениями землистого
цвета с поиз. 1-2-4 мм.

Структура в основной массе иная
ветератойа части илесто-биоморфные
мелкие диаметры до 5-8 см. Часто
окремленные. Сиды гастронор,
кораллов

Особо поверхность верхние 3 м.
Начиная с гл. 100.2 появляются
красной мелко-зернистой подобной
структуры. Порода пятнистая, розова-
ты цвет более глинистых породах
Земноватой красной более глини-
стой мощностью до 5 см.

В ил. 104.3 - 104.7 ветератойа

Внизу самостоятельного базальтового
класта сложенного массивными
глинистыми доломитами с горизонталь-
ной в кровле и подстилающей
микрокристаллической прослойкой. Нижней
3 см. Верхней 7 см.

Внизу 104.7 - 104.8 прослойки серого
доломита проследованного и проследованного,
микрокристаллической.

Жил. гр. известковая, сильно
кристаллизованная ПП со сложными
карманами. Гр. микрокристаллической. Вероятно
сердечной и известковой породы
Гр. III и IV

104.8 - 109.8
5,0 (4,2)

Самостоятельный чешуйчатый
верхней части до гл. 104.2.
доломит, мелко-тонкокристаллической.
микрокристаллической и микро-кристаллической
Участки до микрокристаллической

1
навернутой и пористой. Серый,
нерегулярно волнисто-среднеплотный;
прерывистыми прослойками зелено-
ватого цвета до 2-3 см,
(0,5 мм),

плотность и частота в туз увеличи-
вается. В средней части 107,2 - 108,4
горизонтально слоистой прослой.
до 10 см. Чередование 1:1
Побуды, строматолитов

Жилчатая часть относительно пере-
даточно слоистой доломит. Прослой
мерли до 1 см 2 см.

Ветви прослой микотристового мши,
6 см, через 50 см. В самой подошве
одни из мши.

Жиле. ар. ППГ иррациона с тонкими
ходами.

109.8 - 111.1

1.3 (1.2)

Доломит, ^{светло}зеленоватосерый, тонко-
кристаллический, мелко-
зернистый. Волнисто-средневолокни-
стый, с домеритом (зеленым)
количество домерита 0,5-2. с частыми
вкраплениями кварца.
В кровле слой доломита (I) мелко-
зернистый
В низу переход постепенно

111.1 - 112.8

1.9 (1.4)

Доломит, тонкокристал. иловый
коричневато-серый

Волнисто-средневолокнистый

Домерит коричневатосерый, мощность 2-3 см.

2:1. Четкими границами

112.8 - 116.4

3.6 (3.8)

Доломит, мелкокристал. иловый
до ильменитовидного,
серый до коричневатосерого.
~~сильно~~ битуминозный, волнисто-

средне-нерегулярно слоисты.

С. прослоями корал. домерита
с частыми ходами мшеров,
мощ. 0,5-5 см., бугристо-узкий.

В верхних метрах доминируют листистый
ридик кораллы.

Угловая с гл. 115.6 порога
плотная. Преход в известняк.

Нижняя гр. ридик, двойная.
ППП с ридиком мширизованными
галками.

Граница сопоставляется с нижней
гр. наклонной волны.

116.4 - 127.2 Чт/ Волнисто-слоистые мшеров.

10.8 (8.7) известняк ^{мшеров} до мшеров-мшеровити-
тового, светло-серого и
мширя (листьев, тонкослоистый)
Верхний 1,2 м. Чт с известняком

7

перелам, с ив. притока 117.0,
117.4, 117.6. Чередование мелкоком-
ковато 1:2, волнисто сурьмист. 1:3.
Мш. 117.4 - 118.7 - 3:1. Мелз.

перелам 1-2 см. ив. 5 см.

Мш. 118.7 - 122.3 1:1 до 2:3

127.2 волнисто слоистый.

126.4 Мш. 122.3 - 126.4 3:2 до 2:1

интервалы мелкокомковатый

Мш. 126.4 - 127.2 1:2 до 1:3

полого - волнисто слоистый.

По всему интервалу 5 см горизон-
тальными мелко-гидризовыми хребтами
и являясь и ридии биоморфности-
ми (123.3, 122.2 (10 см), 124.4 (3 см)
124.1 (2 см) ~~флюид~~ до 1 см), 125.8 (3 см)

то части табурет (Halyisideris)
и огромного порн.

struclandra 125.3 (2 см) 126.5 (2 см)

То увеличению пористости.

123.2 граница между извест.
В конусе ит., такая же зр. 127.2
и плохо выраженная ПП.

127.2 - 137.8

106

Ит. ерши - мелкокомоват.
листый + мелкокристовый, част.
ми ходами илов, с черными лиственными, зеле-
ными, ходами илов.

Составленный:

Верхний итр 2:1 - мелко-
волнисто-слоистый с массивными
табуретками, в ряду *Calymene*.

Ит. 128.2 - 132.5 - ит. 3:2 - 1:1

Неравномерно комоватый (ср.-мелк.)
с горизонт. прослойк., с темными
табуретками

129.0 илесто-биоморфный брахиподовый прослой 5 см.

132.1 - ~~глы~~ 2 см прослой крупно-гиритовый.

132.5 слабовыраженная гр. ишамов.

Ишамы 132.5 - 133.5 похожи на 127.2 - 128.2. (Верхний часть ишам).

Ишамы 133.5 - 136.7 → мелкомаховатый, илестый илесто-гиритовый. Соотнош. 3:1 до 2:1.

136.7 - 137.8 - 3:1 среднотонкого. средности до среднотонкого.

Тонк. 1-2 см. мощностью

Сортированно-биоморфно-гиритовый прослой 134.4 (1 см)

135.4 (1 см.)

135.8 (2-3 см.)

Ушисто-гиритовый 135.3 (2 см)
135.7 (5 см); 134.9 (1 см)

Гиритовый просяной 136.4 (2 см)

Хиткая гр. резкая, неровная,
голыстая, граница низовья мот.

137.8 - 143.0 Самостоятельный ушаст.

5.2 (5.0) Верхняя часть 137.8 - 141.1

тонколист. изл. листовой, иловый,
мелкоузловатый, горизонтально-го
среднего ^{толщины} слоистый. Средне-го
толстолистный.

Кирпич листовой мелко-
голы 1-2, кончики глян.

Ка на. 141.1 МВ?

В нижней части волнисто-средне-
слоистый го мелкокомковатый. (141.9 -
142.3).

Витый бороздчат просяной.

Дернотве прослой 140.9, 142.2 и,
142.8 и 143.0.

Жилная гр. желтая, желтая
слабо приотделанная.

143.0 - 146.5 известняк, тонко-до мелкокрист.
3.5 (3.5) слабо до мелкокрист., слабо-
серый, мелкозернистый, иловый
до доломитово-иловый. Волнисто-
мелкосреднекрист.

Мирная кристаллическая, зеленоватая
Соотнош. 1:4 и 1:5

§ Число-дир. 143.8 (5 см) прослой.

Число-дир. 144.3 (2 см)

Число-биоморф. дир. 145.9 - 146.0

Жилная гр. известняк
переход.

146.5 - 163.0

16.5 16.2

известная, микро-серпентин,
желтого-серый, перитовый
узловатый. Волнисто-среднезернистый
до полукристаллический

Минералы: монок., 1-2 см., углисто-
зернистый в изв.

Жил. гр. ровная ППП изобилие
карманы, галеры.

163.0 - 191.0

28.0 26.0

Изв. и перит до зернисто-мелкого.
тонко-до мелкозернистый, кристаллический
волнисто-среднезернистый.

Перитовый кристаллы 171.3

Составом. 2:1 до 3:2. В изв.
2:3

Простой перлит 2-5

Руды: перит 1-2 м. 2-5 см. монок.,
мелко-зернистый

~~184.2~~ 184.2 - 188.0 более
карбонатный, 3:2 и 2:1

В туз переход постенный

191.0 - 200.4

9.4 (9.0)

изг. иловит глинистый

среди - мелкокомковатый 191.-¹⁹⁵~~195~~)

мелко. до конца.

вверху. 2:3 до 195

внизу. 1:2

переход в туз постенный

200.4 - 203.0

2.6

2.5

аналогичный известняк. глинист.

тонк. , тонкоар. среднекомковатый

в средней части мелкокомковатый
(201.6 - 202.4)

Вверху и ~~внизу~~ 2:1

в середине 1:1

внизу 3-4:1

жирс. пр. лопат, волнистая.

Поверхности без илар. с илар. - тонк.
гипсами и с 2 см. прослой

ились-добр. материя на
гальвани.

203.0 - 221.4

18.4 15.1

Цв. землистый желтый в
основном округло-мелко-средне-
комковатый.

Соотнош: 203.0 - 204.7 2:3

204.7 - 205.5 1:1 - 2:1 - 3:1

203.3 ; 203.4 ; 203.5 - слабые пятна
поверхности без мин.-вм, вилки
которых тонкие слои мелко-зернист.
205.5 - гр. транскрипционного ритма.

205.5 - 207.4 ритм. верхняя 2:1
мелкокомков.

нижняя, 1:1. среднеком.

базальный 3:1 среднекомков.

Внизу 2 см истон. зернистый
прослой

215.8 - 219.5 east pruned

207.3 лунка аналогичная из кустов
204.0 мот-добр. 1 см.

204.1 - 214.0 изв. и мистый, иловый
6.9 6.8 тонакристали.

В. верхний покров. 20 до 211.4
округло-мало-сфероидальный
2:3 - 1:2

В нижней части неравномерно
малоокисловатый 3:2; в низу 3:
213.3 - лунка (0,5 см) дупла (3 лунки)
жесткая пр. извая, граница
целост.

214.0 - 215.1 Элиминация.
1.1 Верхний покров. малоокисловатый
2:1
сфероид 1:1

Внизу 40 см 3.-1
Жест. пр. чистая, маркировка 1 см
просеян мот-мелкозернистый, мелкоокисловатый

215.1 - 221.4
06.3 16.3

цв. глинистый, иловый,
мало-срочно-массивный
соотнош. 1:2
м. 1 м. 1:1 волнисто-
слоистый
гитенная граница иловая,
слабо ппн ровная.

221.4 - 224.6
3.2 3.2

цв. глинистый, иловый,
волнисто-слоистый до мало-
комковатого, серый, местами
интенсивно-зеленый, ржаво-
желтый

Соотношение 1:1 - 3:1

Гитенный м. ржаво-желтый
цвет

Гл. 224.0 иловая ровная
ппн мимотизированный

В ручеек глинистых илов перекрывает

224.5 - 227.4 corollae lba, all larynx -
 bitulone punitraem, all
 punitraem butia woodi.

227. all ^{pool.} pin. winged charaxes
 sariwal lba, jame mugulpa
 umel,

237. pg.